

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE  
LXXII. PLANTES RECUEILLIES PAR I. FRANC DE 1905 A 1930  
(13<sup>e</sup> SUPPLÉMENT)

Par A. GUILLAUMIN,  
PROFESSEUR AU MUSÉUM.

- Melia Azedarach* L. — Sans localité (1990).  
*Leucæna glauca* Benth. — Sans localité (1632).  
*Pancheria obovata* Brong. et Gris. — Prony (1776, 1777, 1790).  
*P. Sebertii* Guillaum. — Mont Koghi (312).  
*Codia incrassata* Pampan. var. *major* Bak. f. — Prony : pied du Mont Oungoné (1930).  
*Cunonia Balansæ* Brong. et Gris. — Prony (1860).  
*Syzygium macranthum* Brong. et Gris. — Sans localité (1681).  
*Ixora kuakensis* S. Moore. C'est à cette espèce et non à *I. cauliflora* qu'appartient l'échantillon ; Prony (1699 série A).  
*Morinda Candollei* Beauvis. var. *sub-villosa* Guillaum. — Prony (1853).  
*Psychotria Le Ratii* Guillaum. — Prony (1808).  
*P. rupicola*. Schltr. — Prony (1805 série A, 1898).  
*P. speciosa* S. Moore. — Prony (1503 série A).  
*Ochrosia Thiollieci* Montr. — Tonghoué (735).  
*Alyxia brevipes* Schltr. ? — Prony (1857).  
*A. celastrinea* Schltr. ? — Yahoué (826). C'est peut-être aussi à cette espèce, et non à *A. brevipes* qu'il faudrait rapporter l'échantillon : Dumbéa (826 série A).  
*A. glaucophylla* Heurck et Müll. — Arg. — Prony (1607 série A).  
*Alstonia coriacea* Panch. ex. Guillaum. — Prony (1809).  
*A. filipes* Schltr. ex Guillaum. — Prony (235 série A).  
*A. lanceolifera* S. Moore. — Val Suzon (2473) Prony (224), ce dernier rapporté antérieurement à *A. Lenormandii*.  
*A. Lenormandii* Heurck et Müll. — Arg. — Dumbéa (1999), Mont Koghi (2317), Prony (1690 série A, 1809 série A).  
*Parsonsia brachiata* Baill. ex Guillaum. — Nouméa (574).  
*P. carnea* Panch. ex Baill. — Sans localité (422 série A); Prony (1642 série A).

**P. Francii** Guillaumin. sp. nov.

*Scandens, ramis gracilibus, glabris, foliis 4-nis, ovatis (8-11 cm. × 4-6 cm.), apice rotundatis, basi sub rotundatis, rigidis, nervis 6-7 jugis, procul a margine arcuatis, petiolo valido, 3-4 cm. longo. Inflorescentiæ pedunculo brevissimo, densæ, 2-2,5 cm. longæ; alabastris ovoideis, 6 mm. longis, pedicello 2-plo brevioribus, tenuiter puberulo, calycis lobis late ovatis, 3 mm. longis, margine ciliolulatis, intus basi squamatis, tubo brevissimo, corollæ tubo brevissimo, ad faucem parce barbato, lobis calycinis 3-plo brevioribus, tortis, ovatis, antheris 3 mm. longis, glandulis tubo membranaceo ovarium vestiente coalitis, ovario globoso, glabro, 1 mm. longo.*

Prony (1934).

*P. glaucescens* Baill. ex Guillaumin. — Prony (1661 série A).

**P. Longiflora** Guillaumin. sp. nov.

*Scandens, ramis sat validis, dense rufo velutinis, foliis oppositis late ovatis (10-14 cm. × 8-11 cm.), apice acute acuminatis, basi truncatis, coriaceis, supra costa excepta glabris, subtus brevissime puberulis, nervis 6-7 jugis ut costa veniique supra profunde impressis subtus prominentibus, petiolo valido, 3-5 cm. longo, rufo velutino. Inflorescentiæ fere 10 cm. longæ, rufo velutinæ; alabastris cylindricis; floribus usque 2,5 cm. longis, pedicello 5 mm. longo, calycis lobis tubo æquilongis, ovatis, 2 mm longis, intus basi minute squamatis, extra dense velutinis, corollæ tubo 12 mm. longo, extra velutino, intus glabro, lobis linearibus, tubo fere æquilongis, extra velutinis, intus basi penicille barbatis, antheris 7 mm. longis, filamentis ad apicem lanuginosis, glandulis in tubo 5-dentato connatis, ovario æquilongo, ovario turbinato piloso, 1,5 mm. longo.*

Prony (1730 série A) étiqueté à tort *P. esculenta*.

*Gymnema sylvestre* R. Br. var. *lanceolato* Guillaumin — Nouméa (1343).

*Secamone insularis* Schltr. — Nouméa (1330 pro parte, 1546 série A).

— var. *angustifolia* Schltr. — Nouméa (1330 pro parte).

*Masdenia nigriflora* Guillaumin. — Prony : Touaourou (1936).

*Geniostoma floribunda* Baill. — Prony (1532 série A), Mont Koghi (546). Ce dernier échantillon est comparable à (*Vieillard* 703 bis) qui n'est qu'une forme ou une variété de *G. floribunda*.

*G. oleifolium* S. Moore. — Prony (546 série A).

*G. vestitum* var. *dumbeense* Guillaumin. — Dumbéa (498 série A).

*Smilax neo-caledonica* Schltr. — Prony (1698).

*Paspalum dilatatum* Poir. — Prony (2190).

*Eragrostis atrovirens* Trin. form. *Brownii* Hack. — Nouméa. (2142, 2192, 2199).

*E. pilosa* Beauv. — Nouméa (2198), Prony (2189).